



DATOS GENERALES

| | |
|------------------------------|--|
| IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: | AVGUST COLOMBIA S.A.S. Av. Carrera 45 N° 108-27 Torre 2 Oficina 905, Bogotá D.C, Colombia Tel: - 57 (1) 404 3723 |
| CLASE: | FUNGICIDA AGRÍCOLA |
| FORMULACIÓN: | Concentrado emulsionable (EC) |
| REGISTRO NACIONAL ICA N°: | 449 |
| PRESENTACIONES AUTORIZADAS: | 100 cc, 1 L, 4 L, 20L. |
| INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA: |  CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO  |

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|--------------------------|--|
| COMPOSICIÓN GARANTIZADA: | Ingrediente activo: Propiconazole..... 250 g/L Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro |
| GENERALIDADES: | KYO® 250 EC , fungicida sistémico con acción preventiva, curativa y erradicante. Se absorbe y se transloca rápidamente, deteniendo el desarrollo de las enfermedades y protegiendo los brotes nuevos. KYO® 250 EC , inhibe la síntesis del Ergosterol en la formación de la membrana celular de los hongos, causando la muerte. |

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
 “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS | *P.C./días | **P.R./horas |
|---------|---|----------|------------|--------------|
| ARROZ | MANCHADO DEL GRANO (<i>Helminthosporium spp</i>) | 0.5 L/ha | 30 | 24 |

*P.C.: **Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R.: **Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda la aplicación de **KYO[®] 250 EC** de acuerdo al cuadro de usos, condiciones ambientales y con base a los resultados del monitoreo y el umbral de acción, aplicándose dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, y complementando con las demás prácticas de manejo integrado de cultivo y recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas (FRAC).

Aplicar en máximo embuchamiento del arroz o con 3-5 % de espigamiento y rotar con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

KYO[®] 250 EC se puede aplicar por vía terrestre, utilizándose los equipos convencionales (pulverizadoras manuales, auto-propulsadas y/o acopladas a tractor) los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso (limpios y calibrados), que permitan que el producto tenga un óptimo desempeño; seguir los métodos de calibración recomendados por el fabricante del equipo a ser utilizado, utilizar boquillas de cono hueco y presión constante para evitar que gotas muy pequeñas sean desplazadas. Para preparar la mezcla de aplicación, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego agregar la dosis recomendada del producto agitando continuamente y completar el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogeneizar la mezcla. Realice el triple lavado del envase y agréguelo a la mezcla. La mezcla se debe aplicar inmediatamente.

Limpie bien el equipo usado después de aplicar el producto para que no haya daño a cultivos susceptibles que se asperjen posteriormente.

Volúmenes de mezcla recomendados:

Aplicación terrestre: 120 - 150 L/ha

Aplicación aérea: no menos de 40 L/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 - 018000916012



CO-22/08/2019