

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 1 de 3	

<i>Elaborado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Revisado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Aprobado por: Mónica Álvarez</i>
Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos regulatorios

PROPICONAZOLE 250 EC-DVA

Registro Nacional ICA No. 1116

Titular del Registro: DVA DE COLOMBIA LTDA.

GENERALIDADES

Tipo de Producto:	Fungicida Agrícola
Formulación:	Concentrado Emulsionable-EC
Ingrediente Activo:	Propiconazole
Concentración:	250 g/L
Categoría Toxicológica:	II – Moderadamente Peligroso
Cultivo:	Arroz, Banano
Presentación Disponible:	1 y 20 L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPICONAZOLE 250 EC-DVA es un fungicida sistémico y residual, de amplio espectro, que aplicado al follaje tiene efecto protectante y curativo. Es eficaz en el control de hongos Ascomicetos y basidiomicetos en arroz. La sustancia activa es absorbida rápidamente y translocado por vía ascendente. Puede ser aplicado en agua, emulsiones de aceite y agua o aceite solamente. Actúa sobre los hongos inhibiendo la síntesis y función de las membranas y paredes celulares. Ello ocurre cuando se están formando los haustorios secundarios, deteniéndoles el desarrollo e interfiriendo con la síntesis de los esteroides de las membranas celulares. Por ello, actúa contra razas resistentes a los fungicidas Benzimidazoles, ya que tiene un modo de acción diferente. Los mejores resultados se obtienen cuando se ha iniciado la infección, pero antes de que aparezcan los síntomas.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:	
Propiconazole.....	250 g/L
(2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazole	
Ingredientes aditivos.....	c.s.p. 1 L

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 2 de 3	

<i>Elaborado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Revisado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Aprobado por: Mónica Álvarez</i>
Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos regulatorios

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

Cultivo	Enfermedad	Dosis	P.C.	P.R.
Arroz	Manchado del grano producido por: <i>Curvularia, Helminthosporium, Colletotrichum y Fusarium</i>	0.5 L/ha	21 días	8 horas
Banano	Sigatoka negra (<i>Micosphaerella fijiensis</i>)	0.4 L/ha	7 días	4 horas

P.C: Periodo de Carencia: Intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplice dentro de un programa de manejo integrado (MIP). **PROPICONAZOLE 25 EC-DVA** es un fungicida que debe aplicarse cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Aplicar como máximo dos (2) veces por ciclo de cultivo, la primera al inicio de la floración y la segunda 15 días después.

EQUIPO Y VOLUMEN DE LA MEZCLA

Se puede aplicar con los equipos convencionales de aplicación terrestre y aérea. Usar boquillas de cono hueco. Utilice una cantidad de agua suficiente para asegurar una excelente cobertura de la aspersión (200 – 400 L/ha). Llene con agua limpia el tanque de mezcla hasta ¼ de su capacidad, agregue la dosis recomendada del producto, agite vigorosamente hasta obtener una disolución completa y lleve a volumen final agregando agua. Continúe agitando.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

	FICHA TÉCNICA	Código	GRA-DO-001
		Versión	2
		Fecha	20/01/20
		Página 3 de 3	

<i>Elaborado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Revisado por: Mónica Álvarez</i>	<i>Aprobado por: Mónica Álvarez</i>
Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Cargo: Coord. Asuntos regulatorios

Es compatible con productos de uso común en el control fitosanitario del arroz, sin embargo, debe realizar pruebas previas de compatibilidad. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso indicadas, con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.**

	 CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO	
---	--	---

Formulado por:
SINOCHEM NINGBO LTD.
 21 Jiangxia St., Ningbo 315000. China.

Importado y Distribuido por:
DVA DE COLOMBIA LTDA.
 Km. 1.5 Vía Chía – Cajicá
 Centro Empresarial Oxus Oficina 509
 PBX: 7427042
 Chía (Cundinamarca) - Colombia